

ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະໂຫຍດ
ຫຼາຍສຳຫຼັບຜູ້ປົກຄອງ ແລະ
ພະນັກງານແພດໝໍໃນການເຂົ້າໃຈ
ອາການໂອທິສຕິກໃຫ້ດີຂຶ້ນເພື່ອ
ຮູ້ຈັກວິທີຮັບມືທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ທ່ານນາງ ໂພຄຳດວງດາລາ
ປະທານສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ

ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມທ່ານໝໍປິ່ນປົວ
ທົ່ວໄປ ແລະ ຊ່ຽວຊານຈິດຕະ
ວິທະຍາການແພດ ເຫັນວ່າ
ປຶ້ມຄູ່ມືເຫຼົ່ານີ້ ເປັນເຫຼັ້ມທຳອິດ
ໃນປະເທດລາວ ແລະ ເປັນຄູ່ມືທີ່ມີ
ຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍສຳຫຼັບແພດໝໍ,
ຜູ້ປົກຄອງ, ຄູອາຈານ ແລະ
ນັກສັງຄົມ ສົ່ງເຄາະທີ່ເຮັດວຽກກັບ
ເດັກນ້ອຍທີ່ ພັດທະນາການຊ້າ.
ປຶ້ມຄູ່ມືເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ
ແບບເປັນຮູບພາບ ແລະ ສາມາດ
ໃຊ້ໃນການສື່ສານແລະເຂົ້າໃຈ
ໄດ້ງ່າຍສຳຫຼັບເດັກທຸກອາຍຸ.

ທ່ານ ໝໍ ມະນີວອນ ທິແກ້ວ,
MDF, MPH, Ph.D.


ຊ່ຽວຊານ ຈິດຕະວິທະຍາການແພດ
ທີ່ປຶກສາ ແລະ ອານວຍການ ສູນ ປິ່ນປົວ ໄຊ-ເມດ

ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມທີ່ຜູ້ປົກຄອງເດັກ
ໂອທິສຕິກ ເຫັນວ່າປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້
ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບ ແລະ
ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບ ໂອທິສຕິກ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປົກຄອງ, ແພດໝໍ, ຄູອາຈານ
ແລະ ສັງຄົມ.
ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຄວາມຮູ້ ເປັນ
ສິ່ງທີ່ປະເສີດທີ່ສຸດ ແລະ ປຸກເຫມືອນ
ເສັ້ນທາງທີ່ນຳໄປສູ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

ທ່ານນາງ ວຽງຊຳ ອິນດາວົງ
ປ.ທ. ທາງດ້ານນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມຄົນພິການ



ປຶ້ມຄູ່ມື ກ່ຽວກັບອາການ ໂອທິສຕິກ



www.facebook.com/laautism.lao

**Help
Autism
Now
Society**

www.helpautismnow.com

ປຶ້ມ 'ຄູ່ມືກ່ຽວກັບອາການໂອທິສຕິກ' ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ບັນດາຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ເດັກໂອທິສຕິກ. ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີເຄື່ອງໝາຍຊີ້ວັດທາງດ້ານຊີວະພາບ (ຕົວຢ່າງ: ບໍ່ສາມາດກວດເຫັນໂອທິສຕິກຜ່ານການກວດເລືອດ) ການທີ່ຈະກວດຫາ ແລະ ບົ່ງມະຕິອາການໂອທິສຕິກນັ້ນ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ການສັງເກດພຶດຕິກຳເດັກ ແລະ ການສຶກສາຂໍ້ມູນຂອງເດັກຢ່າງລະອຽດຈາກພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ.

ປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ຖືກຮຽບຮຽງໂດຍທ່ານນາງ Linda Lee Rn. ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງ HANS ໂດຍອີງໃສ່ການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍໆທ່ານຈາກຂົງເຂດການສຶກສາ ແລະ ການແພດ.

ແປເປັນພາສາລາວແລະດັດປັບໂດຍສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ.

© 2007-2017 ສະຫງວນລິຂະສິດ


Help Autism Now Society
infor@helpautismnow.com
4742 Liberty Road South, # 198
Salem OR 97302, USA

 **Help
Autism
Now
Society**
www.helpautismnow.com

ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ
info@laoautism.org
010 ບ້ານໂພນປ່າເບົ້າ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ




ສາ ລະ ບານ



www.facebook.com/laoautism.laa

ໜ້າ 3	ສາລະບານ
ໜ້າ 4	ຄວາມຂອບໃຈ
ໜ້າ 5	ເມື່ອາຍຸ ໄດ້18ເດືອນ ລູກຂອງທ່ານ ມີພຶດຕິກຳເລົ່ານີ້ບໍ່ ?
ໜ້າ 6-7	CHAT (ແບບຟອມກັ້ນກອງໂອທິສຕິກສຳລັບເດັກນ້ອຍ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 3 ປີ
ໜ້າ 8-15	ອາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຂອງເດັກໂອທິສຕິກ
ໜ້າ 9-10	ບັນຫາດ້ານສັງຄົມ
ໜ້າ 11	ບັນຫາດ້ານການສື່ສານ
ໜ້າ 12-15	ບັນຫາພຶດຕິກຳແປກໆ ຫຼື ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດຊ້ຳໆ
ໜ້າ 16-17	ບັນຫາການເຄື່ອນໄຫວ
ໜ້າ 18	ການຮັບຮູ້ຂອງປະສາດສາດສຳພັດທີ່ຫຼາຍເກີນໄປ
ໜ້າ 19-21	ບັນຫາດ້ານປະສາດສາດສຳພັດ
ໜ້າ 22	ພຶດຕິກຳທຳຮ້າຍຕົນເອງ
ໜ້າ 23-25	ບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພ
ໜ້າ 26	ຄວາມຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບລະບົບທາງເດີນອາຫານ
ໜ້າ 27	ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການນອນ / ການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດ / ການຊັກ
ໜ້າ 28	ຜົນກະທົບຂອງໂອທິສຕິກຕໍ່ຄອບຄົວ
ໜ້າ 29	ບົດບາດຂອງການຝຶກແອບແຕ່ຫົວທີ
ໜ້າ 30	ສັງລວມບັນດາຊ່ອງທາງທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໂອທິສຕິກ
ໜ້າ 31-35	ວິທີຊ່ວຍເດັກໂອທິສຕິກບໍ່ໃຫ້ກົດດັນ/ຢ້ານເວລາໄປຫາໝໍ
ໜ້າ 36	ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາຫຼັກຜູ້ປົກຄອງໄດ້

ຄວາມຂອບໃຈ



www.facebook.com/laoautism.laa

ພວກຂ້າພະເຈົ້າຢາກສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງ ສະມາຄົມ Help Autism Now Society ສຳລັບທຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກໜັກ ເພື່ອສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືສະບັບນີ້ ແລະ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ດັດປັບເນື້ອໃນບາງສ່ວນຂອງປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະ ກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງ ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ.

ປຶ້ມຄູ່ມືເຫຼົ່ານີ້ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນສຳລັບສະມາຄົມ ຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ.

ການເພີ່ມເນື້ອໃນທີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ຫຼາຍໆຄອບຄົວ ທີ່ມີລູກໂອທິສຕິກ.



ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ໂຄງການ TEAM ຂອງ ອົງການເວີລ໌ດເອດຢູເຄຊັນປະຈຳລາວທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຜະລິດ ຂອງປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ສະບັບພາສາລາວ.

ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດພິມຂຶ້ນໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການສຶກສາໂລກ ພາຍໃຕ້ ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ APC-GM-0063, ໂດຍຜ່ານ Advancing Partners & Communities (APC), ເຊິ່ງເປັນ ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື 5 ປີ ທີ່ໃຫ້ທຶນ ໂດຍ ອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງ U.S. ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກທີ AID-OAA-A-12-00047, ເຊິ່ງເລີ່ມຕົ້ນໃນ ວັນທີ 1 ເດືອນຕຸລາ 2012.



Training

Economic
Empowerment

Assistive
Technologies

Medical and
Physical Rehabilitation

ເມື່ອາຍຸ ໄດ້18ເດືອນ ລູກຂອງທ່ານ ມີພຶດຕິກຳເລົ່ານີ້ບໍ່ ?



1. ແນມເບິ່ງໜ້າທ່ານ ແລະ ຊີ້ໃສ່ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ
ທີ່ເດັກຕ້ອງການສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນ?



2. ເບິ່ງຕາມ ເມື່ອ ທ່ານຊີ້ໄປ
ໃສ່ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ?




3. ໃຊ້ຈົນຕະນາການ ເພື່ອລື້ນ
ບົດບາດສົມມຸດໃດໜຶ່ງ?

ຖ້າຄຳຕອບແມ່ນ ບໍ່ ເດັກອາດຈະ
ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນ ໂອທິສຕິກ.
ໃຫ້ພາເດັກໄປພົບໝູ່ຊ່ວຍຊານເພື່ອ
ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ.

CHAT (ແບບຟອມກັນກອງໂອທິສຕິກສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່ກວ່າ 3 ປີ)

ໜ້າທີ 1 (ແບບຟອມນີ້ໃຊ້ສໍາຫຼັບເດັກອາຍຸ 18 ເດືອນຂຶ້ນໄປ)

ໝາຍເຫດ: ແບບຟອມ CHAT ນີ້ ແມ່ນແບບຟອມກັນກອງເອົາຄວາມສ່ຽງຂອງການໂອທິສຕິກ, ຖ້າຜົນຂອງການກັນກອງພົບເຫັນຄວາມສ່ຽງແມ່ນໃຫ້ຜູ້ປຶກສາພາດຕັກໄປພົບໝໍຊ່ຽວຊານເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ. ແບບຟອມນີ້ບໍ່ແມ່ນແບບຟອມທີ່ໃຊ້ໄວ້ປຸງມະຕິຂອງໂອທິສຕິກ.



www.facebook.com/laoautism.laa

ພາກ ກ: ສໍາພາດຜູ້ປຶກສາ

1. ເວລາທ່ານເອົາລູກຂອງທ່ານນັ່ງເທິງຕັກ ແລ້ວຢອກ ເຊັ່ນ ໂຍກໄປໂຍກມາ ຫຼື ຫ່ວງໄປມາ ລູກຂອງທ່ານຮູ້ສຶກມ່ວນກັບການຢອກບໍ່ ? ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ
2. ລູກຂອງທ່ານ ມີຄວາມສົນໃຈໃນເດັກຄົນອື່ນ ບໍ່? ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ
3. ລູກຂອງທ່ານ ມັກປີນຂຶ້ນສິ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຂັ້ນໄດ ບໍ່? ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ
4. ລູກຂອງທ່ານ ຮູ້ສຶກມັກເວລາຫຼິ້ນຈະເອ່ ຫຼື ມັກຫຼິ້ນໝາກລີ້ ບໍ່? ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ
5. ລູກຂອງທ່ານ ເຄີຍຫຼິ້ນ**ບົດບາດສົມມຸດ** ບໍ່ ເຊັ່ນ: ຫຼິ້ນເຄື່ອງກຳປ້າ ແລ້ວເຮັດນ້ຳຊາ ຫຼື ແຕ່ງກິນ ຫຼື ຫຼິ້ນສົມມຸດແບບອື່ນ ບໍ່? ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ
6. ລູກຂອງທ່ານ ເຄີຍໃຊ້ນິ້ວຊີ້ໃສ່ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ **ເພື່ອຂໍ** ສິ່ງນັ້ນ ບໍ່? ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ
7. ລູກຂອງທ່ານ ເຄີຍໃຊ້ນິ້ວຊີ້ໃສ່ຈຸດໃດໜຶ່ງ ຫຼື ສິ່ງໃດໜຶ່ງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາວ**ສົນໃຈ**ໃນສິ່ງນັ້ນບໍ່? ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ
8. ລູກຂອງທ່ານ ສາມາດຫຼິ້ນກັບເຄື່ອງຫຼິ້ນອັນນ້ອຍໆ ເຊັ່ນ: ລົດນ້ອຍໆ, ໂຕຕໍ່ນ້ອຍໆ ຢ່າງຖືກວິທີ ບໍ່ (ໂດຍບໍ່ໄດ້ເອົາມາອີມ, ບໍ່ເອົາມາຮຸກຖູ ຫຼື ດຶກຖິ້ມ)? ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ
9. ລູກຂອງທ່ານ ເຄີຍນຳສິ່ງຂອງມາອ້າງ ຫຼື ສະແດງໃຫ້ທ່ານ (ພໍ່ແມ່) ເຫັນ ບໍ່? ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ

ພາກ ຂ: ໃຫ້ທ່ານໝໍ ຫຼື ຜູ້ປະເມີນສັງເກດເດັກແລ້ວ ເປັນຄົນຕອບ

1. ໃນໄລຍະເວລາປະເມີນເດັກ ເດັກໄດ້ສືບຕໍາກັບທ່ານ ບໍ່? ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ
2. ດຶງຄວາມສົນໃຈຂອງເດັກ ແລ້ວຊີ້ໄປຫາບ່ອນທີ່ມີວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ທ່ານສົນໃຈ ທີ່ຢູ່ອີກຟາກໜຶ່ງ ຂອງຫ້ອງ ແລະ ເວົ້າວ່າ “ເບິ່ງໆຫັ້ນເດ!” ມີ (ໃຫ້ບອກຊື່ຂອງຫຼິ້ນທີ່ຊີ້ໃສ່ນັ້ນ)! ແລ້ວໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງໜ້າ ຂອງເດັກ ວ່າເດັກເບິ່ງໄປຫາສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງຊີ້ໃສ່ນັ້ນ ຫຼື ບໍ່? ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ
3. ດຶງຄວາມສົນໃຈຂອງເດັກ ແລ້ວເອົາເຄື່ອງຫຼິ້ນໃຫ້ເດັກ ເຊັ່ນ: ຈອກ ແລະ ການ້ຳຊານ້ອຍ ແລະ ເວົ້າວ່າ “ເຮັດນ້ຳຊາໃຫ້ແດ່ຈອກໜຶ່ງໄດ້ບໍ່?” ແລ້ວສັງເກດເບິ່ງວ່າ ເດັກສາມາດເຮັດສົມມຸດຖອກນ້ຳຊາ, ດື່ມນ້ຳຊາ, ແລະ ອື່ນໆ ບໍ່? ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ
4. ບອກເດັກວ່າ “ດອກໄຟຢູ່ໃສ?”, ຫຼື “ຊອກດອກໄຟໃຫ້ແດ່” ແລ້ວສັງເກດວ່າເດັກສາມາດ ຊີ້ໄປໃສ່ດອກໄຟດ້ວຍມືຂອງລາວ ຫຼື ບໍ່? ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ
5. ເດັກສາມາດ ກໍ່ຕຶກນ້ອຍດ້ວຍໂຕຕໍ່ໄມ້ໄດ້ ຫຼື ບໍ່? ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນ
ຖ້າຕໍ່ໄດ້ ແມ່ນເດັກຕໍ່ໄດ້ຈັກອັນ? _____

ຂ 2: ໃນຂໍ້ 2 ຂອງພາກນີ້, ໃຫ້ໝາຍ “ແມ່ນ” ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເດັກສາມາດແນມເບິ່ງຫວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ທ່ານກຳລັງຊີ້ໄປຫາ ບໍ່ແມ່ນແນມໄປທີ່ມີຂອງທ່ານ


ຂ 3: ໃນຂໍ້ 3 ຂອງພາກນີ້, ໃຫ້ໝາຍ “ແມ່ນ” ຖ້າເດັກສາມາດຫຼິ້ນບົດບາດສົມມຸດແບບອື່ນໆໄດ້

ຂ 4: ໃນຂໍ້ 4 ຂອງພາກນີ້, ຖ້າເດັກບໍ່ເຂົ້າໃຈຄຳວ່າ “ດອກໄຟ” ໃຫ້ຖາມຫວັດຖຸສິ່ງຂອງອື່ນທີ່ຢູ່ໄກອອກໄປ ເຊັ່ນ: “ຕຸກກະຕາຢູ່ໃສ?” ໃຫ້ໝາຍ “ແມ່ນ” ເມື່ອເດັກສາມາດຊີ້ໄປຫາສິ່ງຂອງນັ້ນພ້ອມທັງແນມໜ້າຂອງທ່ານໃນເວລາດຽວກັນ.

(ໃຫ້ເບິ່ງໜ້າຕໍ່ໄປ ສໍາລັບຄຳແນະນຳໃນການໃຫ້ຄະແນນແບບສອບຖາມ)

CHAT (ແບບຟອມກັນກອງໂອທິສຕິກສຳລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕຳກວ່າ 3 ປີ)

ໜ້າທີ 2



ບັນດາຄຳຖາມສຳຄັນຕົ້ນຕໍຂອງ CHAT ພາກ ກ

ກ 5: ຫຼິ້ນບົດບາດສົມມຸດ

ກ 7: ການຊີ້ນຳສ້າງຄວາມສົນໃຈ KK(ຊື່ໃຫ້ເບິ່ງ)

ພາກ ຂ

ຂ 2: ການເບິ່ງໄປນຳຈຸດທີ່ຊີ້ບອກ

ຂ 3: ການສົມມຸດເຮັດ ຫຼື ຫຼິ້ນອັນໃດອັນໜຶ່ງ

ຂ 4: ການຮູ້ວ່າຈະຊີ້ໄປຫາສິ່ງທີ່ບອກ

ບັນດາຄຳຖາມທີ່ບໍ່ສຳຄັນຕົ້ນຕໍຂອງ CHAT ພາກ ກ

ກ 1: ການຢອກຫຼິ້ນແບບແກ່ວງໄປມາ

ກ 2: ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ສັງຄົມອ້ອມຂ້າງ ຫຼື ເດັກຄົນອື່ນ

ກ 3: ພັດທະນາການດ້ານການເຄື່ອນໄຫວ

ກ 4: ການຫຼິ້ນໃນສັງຄົມ ຫຼື ຫຼິ້ນກັບເດັກຄົນອື່ນ

ກ 6: ການຊີ້ເພື່ອຂໍ ຫຼື ຢາກໄດ້ສິ່ງໃດໜຶ່ງ

ກ 8: ການຫຼິ້ນກັບເຄື່ອງຫຼິ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ກ 9: ການສະແດງ ຫຼື ອວດອ້າງ

ພາກ ຂ

ຂ 1: ການສື່ສານທາງສາຍຕາ

ຂ 3: ການກໍ່ຕົກນ້ອຍດ້ວຍບ່ອກໄມ້

ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ

ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ຕໍ່ການເປັນໂອທິສຕິກ

ຖ້າຕອບ “ບໍ່ແມ່ນ” ຂອງຄຳຖາມ ກ5, ກ7, ຂ2, ຂ3, ຂ4

ມີຄວາມສ່ຽງປານກາງ ຕໍ່ການເປັນໂອທິສຕິກ

ຖ້າຕອບ “ບໍ່ແມ່ນ” ຂອງຄຳຖາມ ກ7, ຂ4 (ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງສູງ)

ມີຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ ຕໍ່ການເປັນໂອທິສຕິກ

ບໍ່ນອນຢູ່ໃນ ສອງ ກຸ່ມສ່ຽງຂ້າງເທິງ

ຄຳແນະນຳໃນການປະຕິບັດ

ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ

ໃຫ້ນຳສິ່ງໄປຍັງຄລິນິກກ່ຽວກັບພັດທະນາການ ຫຼື ໜ້າທີ່ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ


ກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງປານກາງ

ມີຄວາມສົງໄສສູງ -- ໃຫ້ນຳສິ່ງໄປຍັງສະຖານທີ່ທີ່ກັບຄວາມສ່ຽງສູງ
ມີຄວາມສົງໄສຕ່ຳ -- ໃຫ້ທົດສອບຄືນ ໃນໜຶ່ງເດືອນ

ກຸ່ມມີຄວາມສ່ຽງຕ່ຳ

ຖ້າມີຄຳຕອບ “ບໍ່ແມ່ນ”, ໃຫ້ທົດສອບຄືນ ໃນໜຶ່ງເດືອນ.

ອາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຂອງເດັກໂອທິສຕິກ



www.facebook.com/laoautism.laa

ດ້ານສັງຄົມ

ດ້ານການສື່ສານ

ດ້ານພຶດຕິກຳທີ່ແປກໆ ຫຼື ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດຊ້ຳໆ


ດ້ານການເຄື່ອນໄຫວ

ການຮັບຮູ້ຂອງປະສາດສຳພັດທີ່ໄວເກີນໄປ


ດ້ານປະສາດສຳພັດ

ການທຳຮ້າຍຕົນເອງ

ຄວາມປອດໄພ



ອາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຂອງເດັກໂອທິສຕິກ



www.facebook.com/laoautism.laa

ບັນຫາດ້ານສັງຄົມ

ອາດຈະບໍ່ສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນການຫຼິ້ນກັບເດັກຄົນອື່ນ



ອາດຈະໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງກັບອ້າຍນ້ອງ


ອາດຈະນັ່ງຮ້ອງໄຫ້ຜູ້ດຽວ
ແທນທີ່ຈະຮ້ອງຫາແມ່



ອາດຈະບໍ່ສັງເກດຕອນພໍ່ແມ່
ອອກໄປ ຫຼື ກັບມາຈາກວຽກ



ອາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຂອງເດັກໂອທິສຕິກ



www.facebook.com/laoautism.laa

ບັນຫາດ້ານສັງຄົມ

ອາດຈະບໍ່ສະແດງຄວາມສົນໃຈ
ໃນການຫຼິ້ນຈະເອ່ ຫຼື ເກມອື່ນໆ
ທີ່ມີປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບກັນ




ອາດຈະຂັດຂຶ້ນບໍ່ໃຫ້ພໍ່ແມ່ອຸ້ມ,
ກອດ ຫຼື ຫອມແກ້ມ



ອາດຈະບໍ່ຍົກແຂນຂຶ້ນ ເພື່ອຢາກໃຫ້ອຸ້ມ
ອອກຈາກຕຽງ ເມື່ອມີໃຜຜູ້ໜຶ່ງຍິ້ນມີ
ຈະໄປອຸ້ມເອົາ

ອາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຂອງເດັກໂອທິສຕິກ



www.facebook.com/laoautism.laa

ບັນຫາດ້ານການສື່ສານ

ເດັກໂອທິສຕິກ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ຮັບຮູ້ສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງຂອງຕົນເອງ ແລະ ອາດຈະມີບັນຫາໃນການສື່ສານດ້ານສາຍຕາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ມີ ຄວາມສົນໃຈໃນການສື່ສານປະເພດໃດເລີຍ.

ເມື່ອພວກເຂົາຕ້ອງການສິ່ງໃດໜຶ່ງ ພວກເຂົາຈະຈັບ “ມືຜູ້ອື່ນໄປຈັບ”. ເດັກຈະວາງມື ຂອງພໍ່ແມ່ ເທິງວັດຖຸທີ່ ຢາກໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ ການໃຊ້ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ ເປັນຕົ້ນ “ເຄື່ອງມື” ເພື່ອເອົາສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ. ເດັກປົກກະຕິທົ່ວໄປ ຈະສື່ສານໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງ ຕ້ອງການດ້ວຍສຽງ ຫຼື ທ່າທາງ ເຊັ່ນ: ການຊື້ບອກ.



ບໍ່ຮັບຮູ້ຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ




ຫຼີກລ້ຽງການສື່ສາຍຕາ

ໃຊ້ມືຜູ້ອື່ນໄປຈັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ



ອາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຂອງເດັກໂອທິສຕິກ



www.facebook.com/laoautism.laa

ບັນຫາພຶດຕິກຳແປກໆ ຫຼື ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດຊ້ຳໆ



ສະບັດມືໄປມາຊ້ຳໆ



ຈ້ອງເບິ່ງພັດລົມເທິງເພດານ




ປີນອ້ອມໂຕເອງ

ລຽງລຶດຂອງຫຼິ້ນ (ຫຼື ເຄື່ອງອື່ນ)



ອາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຂອງເດັກໂອທິສຕິກ




www.facebook.com/laoautism.laa

ບັນຫາພຶດຕິກຳແປກໆ ຫຼື ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດຊ້າໆ



ອາດຈະບໍ່ສະແດງຄວາມສົນໃຈໃນ
ເຄື່ອງຫຼິ້ນ ແຕ່ພັດມັກສິ່ງຂອງອື່ນທີ່
ອາດຈະບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງຫຼິ້ນ




ມັກຈັບລະອອງຝຸ່ນໃນແສງແດດ



ອາດຈະບໍ່ຮູ້ຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນຢ່າງຖືກວິທີ,
ແຕ່ໄປສົນໃຈສະເພາະສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງ
ເຄື່ອງຫຼິ້ນແທນ ເຊັ່ນ: ມັກໝູນຕົ້ນລົດເຄື່ອງຫຼິ້ນ



ອາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຂອງເດັກໂອທິສຕິກ



www.facebook.com/laoautism.laa

ບັນຫາພຶດຕິກຳແປກໆ ຫຼື ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດຊ້ຳໆ



ນັ່ງໂຍກໂຕໄປມາ



ມັກເປີດ-ປິດດອກໄຟຕະຫຼອດເວລາ




ມັກກິນສິ່ງຂອງທີ່ກິນບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ:
ເຄື່ອງນຸ່ງ, ເສື້ອນອນ ຫຼື ຜ້າກັ້ງ



ມັກຫຼິ້ນນິ້ວມືຢູ່ໄກ້
ກັບຕາຂອງໂຕເອງ

ອາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຂອງເດັກໂອທິສຕິກ



www.facebook.com/laoautism.laa

ບັນຫາພຶດຕິກຳແປກໆ ຫຼື ພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດຊ້ຳໆ



ຊອກໄປຢູ່ບ່ອນທີ່ຄັບແຄບ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຕເອງ
ຖືກໜີບເຕັງ


ຫຼິ້ນກັບອາຈົມ (ຂີ້) ໂຕເອງ



ຊອກຫາຫົນທາງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ
ໄດ້ຮັບການກະທົບຢ່າງແຮງ



ອາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຂອງເດັກໂອທິສຕິກ



www.facebook.com/laoautism.laa

ບັນຫາການເຄື່ອນໄຫວ

ເດັກໂອທິສຕິກ ສາມາດສະແດງອາການຄວາມຜິດປົກກະຕິດ້ານການເຄື່ອນໄຫວ ໃຫ້ເຫັນເຊັ່ນ: ເດັກບາງຄົນອາດຈະ ມີທັກສະທີ່ດີໃນການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ພື້ນທີ່ສະເພາະ ໂດຍໜຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ໃນພື້ນທີ່ອື່ນໆ.



ມີຄວາມບົກຜ່ອງທາງດ້ານກ້າມເນື້ອມັດນ້ອຍ ເຊັ່ນຢືບຈັບສິ່ງຂອງນ້ອຍບໍ່ໄດ້ດີ



ການສຳພັນລະຫວ່າງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍມີຄວາມບົກຜ່ອງ, ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ




ຍ່າງແຍ້ງຕີນ



ຂາດຄວາມສາມາດໃນການກະໂລຍະຫ່າງ

ອາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຂອງເດັກໂອທິສຕິກ



www.facebook.com/laoautism.laa

ບັນຫາການເຄື່ອນໄຫວ

ເຖິງວ່າເດັກບາງຄົນອາດມີທັກສະການເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິທົ່ວໄປ ແຕ່ກໍອາດຈະພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດບາງກິດຈະກຳເຊັ່ນ: ການຂີ່ລົດຖີບເດັກນ້ອຍ, ຂີ່ລົດເຄື່ອງຫຼິ້ນ ແລະ ອື່ນໆ.



ມີການຊົງໂຕທີ່ດີເກີນປົກກະຕິ


ຫຼື



ເຊື້ຊ້າ, ບໍ່ຄ່ອງແຄ້ວ




ບໍ່ສາມາດຂີ່
ລົດຖີບນ້ອຍ
ສາມຕີນ ຫຼື
ລົດເຄື່ອງຫຼິ້ນ



ນ້ຳລາຍໄຫຼ

ອາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຂອງເດັກໂອທິສຕິກ




www.facebook.com/laoautism.laa



ເດັກໂອທິສຕິກມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການທົນທານຕໍ່ກັບສິ່ງລົບກວນຕໍ່ປະສາດສຳພັດຂອງເຂົາເຈົ້າເຊັ່ນ: ສຽງເພັງ, ສຽງວົນແຊວ, ຜ້າແພ ຫຼື ເສື້ອຜ້າ ແລະ ປະສົບການໃໝ່ໆ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມໃໝ່ໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ຍິ່ງປະສາດສຳພັດຖືກລົບກວນຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່າໃດ, ຍິ່ງມີແນວໂນ້ມເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ງຸດົງ ຊຶ່ງອາດຈະພາໃຫ້ເກີດພຶດຕິກຳຕໍ່ຕ້ານ ແລະ ອາລະວາດ.

ອາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຂອງເດັກໂອທິສຕິກ



www.facebook.com/laoautism.laa

ບັນຫາດ້ານປະສາດສາດສຳພັດ

ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນເວລາໄປຕັດຜົມ




ບໍ່ສາມາດທົນຢູ່ກັບການຮັດເຂັມຂັດນິລະໄພ

ອາດຈະບໍ່ມັກສິ່ງໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ:
ທຽນວັນເກີດ ຫຼື ປຸມເປົ້າວັນເກີດ



ອາດຈະບໍ່ມັກໃຫ້ອາບນ້ຳ

ອາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຂອງເດັກໂອທິສຕິກ



www.facebook.com/laoautism.laa

ບັນຫາດ້ານປະສາດສາດສຳພັດ

ປວດຮາກກັບກິນຕ່າງໆ
ຢູ່ໃນເຮືອນ



ອາດຈະມີບັນຫາ
ກັບການຟັງເພັງ




ປິ່ນວັດຖຸຕ່າງໆ
ໃກ້ກັບໜ້າໂຕເອງ



ອາດຈະເປັນຄືຄົນຫູບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງຫຍັງ,
ບໍ່ຕົກໃຈຕໍ່ສຽງດັງໆ ແຕ່ບາງເວລາ
ການໄດ້ຍິນຄືບໍ່ຜິດປົກກະຕິຫຍັງ

ອາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຂອງເດັກໂອທິສຕິກ



www.facebook.com/laoautism.laa

ບັນຫາດ້ານປະສາດສາດສຳພັດ



ອາດຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະໃຫ້ນຸ່ງເສື້ອກັນໜາວໃນຍາມໜາວ

ຂັດຂຶ້ນເວລາ
ຈະປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງ



ອາດຈະຈຶກເສື້ອຜ້າ, ກາເທິງເສື້ອ ແລະ
ຮອຍຫຍິບເທິງເຄື່ອງນຸ່ງຂອງໂຕເອງ


**Help
Autism
Now
Society**

www.helpautismnow.com

ຍາມຮ້ອນ ພັດຂັດຢາກ
ຈະໃສ່ເຄື່ອງກັນໜາວ



ອາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຂອງເດັກໂອທິສຕິກ



www.facebook.com/laoautism.laa

ພຶດຕິກຳທຳຮ້າຍຕົນເອງ



ເອົາຫົວທຸບພື້ນແຮງໆ

ກັດຕົນເອງໂດຍບໍ່ສະແດງ
ອາການເຈັບປວດ




ດຶງ ແລະ ຊຸດຜິວໜັງ



ເອົາມືດຶງຜິມອອກມາເປັນກຳ




ອາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຂອງເດັກໂອທິສຕິກ



www.facebook.com/laoautism.laa


ບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພ



ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ້ານຄວາມອັນຕະລາຍ



ອາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຂອງເດັກໂອທິສຕິກ



www.facebook.com/laoautism.laa


ບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພ



ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຕົນເອງອາດຈະໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ໃນສະຖານະການຕ່າງໆ



ອາການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ຂອງເດັກໂອທິສຕິກ



www.facebook.com/laoautism.laa


ບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພ



ບໍ່ຢ້ານຄວາມສູງ



ຄວາມຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບລະບົບທາງເດີນອາຫານ



www.facebook.com/laoautism.laa


ທ່ານ ດຣ. ທິມ ບິວ (Tim Buie) ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານລະບົບທາງເດີນອາຫານ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຮາວິດ (Harvard University) ແລະ ໂຮງໝໍແມສເຈັນເນີໂລ (Mass General Hospital) ຢູ່ເມືອງບອສຕັນ ປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ສ່ອງກວດພາຍໃນທາງເດີນອາຫານຂອງເດັກໂອທິສຕິກຫຼາຍກວ່າ 1.000 ຄົນ. ໃນຈຳນວນເດັກ 400 ຄົນທຳອິດ ໄດ້ພົບວ່າ ບັນຫາລະບົບທາງເດີນອາຫານ ແມ່ນມີຫຼາຍຢູ່ໃນເດັກໂອທິສຕິກ ຫຼາຍກວ່າເດັກປົກກະຕິ.

- 20% ຫຼອດອາຫານອັກເສບ
- 10% ລຳໄສ້ນ້ອຍອັກເສບ
- 55% ພາວະຂາດທາດແລກເທສ
- 12% ລຳໄສ້ໃຫຍ່ອັກເສບ
- 12% ກະເພາະອາຫານອັກເສບ
- ຫຼື ສານທີ່ໃຊ້ຍ່ອຍທາດແລກໂຕສ ໃນອາຫານ

ໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງພາເດັກໄປຫາຊ່ຽວຊານດ້ານລະບົບອາຫານທາງພົບອາການຂ້າງລຸ່ມນີ້




ຖອກທ້ອງ



ພົບເສດອາຫານບໍ່ຍ່ອຍໃນອາຈີມ




ເລືອກກິນແຕ່ອາຫານປະເພດໃດໜຶ່ງຢ່າງດຽວ
ແລະ/ຫຼື ມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວຕໍ່ອາຫານ



ທ້ອງຜູກ

ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການນອນ / ການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດ / ການຊັກ



ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນການນອນ

ເດັກອາດຈະຫຼິ້ນໄດ້ໜີດມື້ ໂດຍບໍ່ມີອາການຢາກນອນ. ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າ ບໍ່ຮູ້ສຶງເກດ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ. ອາດຈະມີບັນຫາໃນການເຂົ້ານອນ ແລະ ບໍ່ຮູ້ສຶກເຫງົາມອນ. ອາດຈະນອນພຽງຊ່ວງເວລາສັ້ນໆ ເຊັ່ນ: ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງຊົ່ວໂມງສຸດ.

ຊຶ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງຕົກຢູ່ໃນສະພາບຂອງການອຶດນອນ.



ການຊັກ

ອາດຈະມີອາການຊັກແຊກຊ້ອນຊຶ່ງ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໄປຕາມອາຍຸ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ



ການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ

ບໍ່ມີ ຫຼື ມີໜ້ອຍ ໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດ

ຫຼື

ການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມເຈັບປວດໃນລະດັບສູງ


ຜົນກະທົບຂອງໂອທິສຕິກຕໍ່ຄອບຄົວ



ຖ້າເດັກໂອທິສຕິກບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ຫົວທີ
ອາດຈະພາໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດກິດຈະກຳທີ່ເຮັດເປັນປະຈຳ

ອາດພາໃຫ້ມີຄວາມເຄັ່ງຄຽດໃນຊີວິດຜົວເມຍ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຄຽດພາຍໃນ
ກຸ່ມອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ຄວນໄປຫາທີ່ປຶກສາດ້ານຄອບຄົວ/ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ແລະ
ກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງທ້ອງຖິ່ນ ອາດຈະຊ່ວຍໄດ້.

ບົດບາດຂອງການຝຶກແອບແຕ່ຫົວທີ




ມີຫຼາຍບົດຄົ້ນຄວ້າ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຝຶກແອບຢ່າງຈິງຈັງແຕ່ຫົວທີ ຈະນຳໄປສູ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີຂຶ້ນ ສຳລັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ. ກົນລະຍຸດເບື້ອງຕົ້ນ ອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນສອນເດັກໃຫ້ຮູ້ຈັກສັງເກດວ່າມີຫຍັງດຳເນີນໄປແຕ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງເຂົາເຈົ້າ, ສອນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ສອນເຂົາເຈົ້າໃນການຮຽນແບບພຶດຕິກຳ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນສອນເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບທັກສະການສື່ສານ ແລະ ອື່ນໆ.



ຖ້າຫາກສັງເກດເຫັນສັນຍານເຕືອນທາງພັດທະນາການລ່າຊ້າໃຫ້ຄອບຄົວ ນຳລູກໄປຝຶກແອບແຕ່ຫົວທີ (EI). ການຝຶກແອບແຕ່ຫົວທີ(EI) ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກແຕ່ລະຄົນຊຶ່ງ ອາດລວມມີ ການຝຶກເວົ້າ, ການຝຶກດ້ານກິດຈະກຳບຳບັດ ແລະ/ຫຼື ການຝຶກທາງກາຍຍະພາບ.


ສັງລວມບັນດາຊ່ອງທາງທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໂອທິສຕິກ



www.facebook.com/laoautism.laa

1. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພັດທະນາການ
2. ການປະເມີນ ຂອງການຝຶກແອບແຕ່ຫົວທີ
3. ການປະເມີນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງ
4. ການຝຶກເວົ້າ
5. ການຝຶກດ້ານກາຍຍະພາບ
6. ການຝຶກດ້ານກິດຈະກຳບຳບັດ
7. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານລະບົບທາງເດີນອາຫານຂອງເດັກ (ຖ້າເດັກຖອກທ້ອງຮຸນແຮງ / ທ້ອງຜູກ ຫຼື ຖ່າຍໜັກບໍ່ເປັນປົກກະຕິ / ອາຈິມມີເລືອດ / ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ / ຮາກຫຼາຍຜິດປົກກະຕິ)
8. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເສັ້ນປະສາດ (ຖ້າອາການຊັກ ປາກົດຂຶ້ນ)
9. ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານໂລກປະສາດເດັກ / ນັກຈິດຕະວິທະຍາ
10. ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ / ທີ່ປຶກສາບັນຫາຄອບຄົວ
11. ກຸ່ມສະໜັບສະໜູນຂອງພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ

ວິທີຊ່ວຍເດັກໂອທິສຕິກບໍ່ໃຫ້ກົດດັນ/ຢ້ານເວລາໄປຫາໝໍ



www.facebook.com/laoautism.laa


ແພດໝໍແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມເພື່ອໃຫ້
ຊອກຫາສາເຫດຂອງ
ອາການ ເຈັບປ່ວຍຕ່າງໆ.
ເດັກໂອທິສຕິກນັ້ນ
ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເບິ່ງຄື
ບໍ່ເຈັບປ່ວຍຫຍັງ; ພວກເຂົາ
ເບິ່ງຄືປົກກະຕິທຸກຢ່າງ ແລະ
ເບິ່ງຄືມີການພັດທະນາການ
ຕາມໄວ.



ແຕ່ບາງຄັ້ງພວກເຂົາ
ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນເດັກ
ທີ່ຖືກພໍ່ແມ່ຕາມໃຈຈົນ
ເກີນໄປພວກເຂົາມີ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່
ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ:
ສະຖານະການໃໝ່,
ປະສົບການໃໝ່ ແລະ
ຄົນຜູ້ໃໝ່.



ວິທີຊ່ວຍເດັກໂອທິສຕິກບໍ່ໃຫ້ກົດດັນ/ຢ້ານເວລາໄປຫາໝໍ



www.facebook.com/laoautism.laa

ຕິດຕໍ່ທາງໂທລະສັບກັບຜູ້ປົກຄອງກ່ອນລ່ວງໜ້າ

ຜົນດີມີດັ່ງນີ້:


1. ໄດ້ປະຫວັດທີ່ຈະແຈ້ງຈາກຜູ້ປົກຄອງ ໂດຍປາສະຈາກການລົບກວນຂອງເດັກຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
2. ຖາມຜູ້ປົກຄອງເຖິງຄໍາແນະນຳວ່າ ຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ການໄປຫາໝໍ ງ່າຍຂຶ້ນ.
3. ບອກຜູ້ປົກຄອງໃຫ້ນຳສິ່ງຂອງ (ສິ່ງຂອງທີ່ໃຊ້ຕໍ່ລອງ) ເພື່ອໄປຍົວະ ຫຼື ດຶງດູດ ໃຫ້ເດັກເຂົ້າຮ່ວມ ເຮັດບົດທົດສອບ.
4. ຖ້າທ່ານ ຄາດຄະເນວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ເຈາະເລືອດເດັກ, ຄວນສັ່ງຢາມືນແບບທາໃຫ້ ຜູ້ປົກຄອງກ່ອນ ເພື່ອທີ່ ຜູ້ປົກຄອງຈະໄດ້ສາມາດທາໃຫ້ເດັກກ່ອນລ່ວງໜ້າການໄປຮອດ.
5. ໃຫ້ການແນະນຳຜູ້ປົກຄອງ ກຽມຕົວເດັກໂດຍການອ່ານບົດເລື່ອງ (Social Story) ກ່ຽວກັບ “ການໄປຫາໝໍ” ແລະ/ຫຼື “ການໄປກວດເລືອດ” ທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍ ອົງການ (HANS) ເວັບໄຊ: helpautismnow.com




ຮັບຟັງຜູ້ປົກຄອງເດັກ

ຜູ້ປົກຄອງ ຖືເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ “ເຂົ້າໃຈ” ລູກຂອງຕົນກ່ວາຄົນອື່ນໆ.

ອາການພາຍນອກໃດໆ ທີ່ເບິ່ງແລ້ວປົນປົວ ໄດ້ຄືເດັກປົກກະຕິທົ່ວໄປ ກໍໃຫ້ປົນປົວໄປ ຕາມອາການນັ້ນ (ໂດຍບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ບັນຫາ ໂອທິສຕິກ ສິ່ງຜິດການຕັດສິນໃຈ ໃນການປົນປົວ).



ວິທີຊ່ວຍເດັກໂອທິສຕິກບໍ່ໃຫ້ກົດດັນ/ຢ້ານເວລາໄປຫາໝໍ



ການກະກຽມຫ້ອງກວດ

ນາງພະຍາບານ ຫຼື ຜູ້ຊ່ວຍແພດ
ສາມາດກວດເບິ່ງສະຖານທີ່ ຫຼື
ຫ້ອງກ່ອນລ່ວງໜ້າຮ່ວມກັບຜູ້ປົກຄອງເດັກ.
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ອາດຈະລວມມີ:

ຫ້ອງທີ່ງຽບສະຫງົບ

ຫ້ອງທີ່ບໍ່ມີປ່ອງຢ້ຽມ

ບໍ່ມີດອກໄຟສະຫວ່າງຫຼາຍ

ບໍ່ມີສຽງເພັງ



ຖ້າຈຳເປັນ ກໍ່ໃຫ້ຢຶກຍ້າຍສິ່ງຂອງທັງໝົດທີ່ອາດຈະຖືກໃຊ້ເປັນອາວຸດ ຫຼື ສິ່ງອັນຕະລາຍ.

ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ເຮັດໃຫ້ເວລາຂອງການລໍຖ້າໜ້ອຍທີ່ສຸດ

ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດ:

ໃຫ້ຈັດລຳດັບການນັດພົບຂອງເດັກເປັນ
ຄົວທຳອິດໃນມື້ນັ້ນ (10 ນາທີ ລ່ວງໜ້າ
ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ ເດັກພົບເຫັນ ຄົນອື່ນໆ
ເວລາເຂົ້າເຈົ້າໄປເຖິງ).

ຜົນດີທີ່ໄດ້ຈາກການປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ:


ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ:

1. ເດັກຈະເກີດ “ຄວາມໂມໂຫໃຈຮ້າຍ”
2. ການລົບກວນຜູ້ອື່ນໃນຫ້ອງລໍຖ້າ
3. ຄວາມອັບອາຍຂອງຜູ້ປົກຄອງ
4. ການທຳລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຫ້ອງລໍຖ້າ



ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ແມ່ນໃຫ້ລົງທະບຽນເດັກໄວ້ລ່ວງໜ້າຜ່ານທາງໂທລະສັບ

ວິທີຊ່ວຍເດັກໂອທິສຕິກບໍ່ໃຫ້ກົດດັນ/ຢ້ານເວລາໄປຫາໝໍ



f www.facebook.com/laoautism.laa

ບາງສິ່ງອາດບໍ່ເປັນດັ່ງທີ່ທ່ານເຫັນ

ເດັກໂອທິສຕິກໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ອາດເບິ່ງຄືວ່າເປັນເດັກທີ່ຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫຼືຖືກທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງພຶດຕິກຳຂອງເຂົາເຈົ້າດັ່ງນີ້:


ພຶດຕິກຳທຳຮ້າຍຕົນເອງຢ່າງຮຸນແຮງເຊັ່ນ:

ກັດຕົນເອງ, ເອົາຫົວທຸບຝາ ຫຼື ພື້ນ, ຊຸດຕົນເອງ ແລະ ອື່ນໆ.

ບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບ ຫຼື ອາດຈະຮູ້ເຈັບໜ້ອຍ.

ບໍ່ຮູ້ຈັກຢ້ານອັນຕະລາຍ

ມີບັນຫາດ້ານປະສາດສຳພັດທີ່ໄວເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງແລະ ອາບນ້ຳ



ລະມັດລະວັງຕໍ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ

ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ

ເດັກໂອທິສຕິກບາງຄົນອາດຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າທ່ານກຳລັງຈະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ, ກົງກັນຂ້າມ ເຂົາອາດຄິດວ່າທ່ານກຳລັງຄຸກຄາມເຂົາເຈົ້າ. ບາງຍາມເຂົາອາດຈະສະຫງົບນຶ່ງ ແຕ່ຕໍ່ມາອາດຈະເກີດອາລົມຮ້າຍ ແລະ ອາດຈະ:

ເອົາຫົວຕຳ

ກັດ

ຕະ

ຖິ້ມນ້ຳລາຍ


ຕີ

ດຶງຜົມ

ກອດໂຕເອງ ແລະ ອື່ນໆ



ວິທີຊ່ວຍເດັກໂອທິສຕິກບໍ່ໃຫ້ກົດດັນ/ຢ້ານເວລາໄປຫາໝໍ




 www.facebook.com/laoautism.laa

ມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າໃຈພາສາ ແລະ ການເວົ້າ

ເດັກໂອທິສຕິກບາງຄົນສາມາດ
ເລົ່າເລື່ອງກະຕຸນທີ່ໂຕເອງເບິ່ງມາ
ໄດ້ຢ່າງລຽນໄຫຼ ແຕ່ບໍ່ສາມາດ
ບອກຊື່ຂອງຕົນເອງ ແລະ
ບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າຕົນເອງ
ເຈັບຫຍັງ.

ພວກເຂົາອາດຈະພົບ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າໃຈ
ສິ່ງທີ່ເຂົາໄດ້ຍິນ.



ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບັນຫາທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຄອບຄົວ

ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນອາດຈະ
ຊອກຫາ:

ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບັນດາ
ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ

ກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປົກຄອງ

ຫຼື ການບໍລິການທີ່ຊ່ວຍ
ໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ໄປພັກຜ່ອນ



ອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ສາມາດໃຫ້ຄໍາປຶກສາຫຼັກຜູ້ປົກຄອງໄດ້

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ (AfA)
ຫນ່ວຍງານກ້ານກອງ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

<http://blog.laoautism.org>

ບ້ານໂພນປ່າເບົ້າ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ

ໂທ: 021 330409, 030 5329045

ອີເມວ: consultation@laoautism.org

- ໃຫ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແກ່ຜູ້ປົກຄອງກ່ຽວກັບປະເພດຂອງຄວາມພິການທາງດ້ານພັດທະນາການ, ຄວາມພິການທາງດ້ານສະໝອງ ແລະ ບັນດາອາການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ກ້ານກອງພັດທະນາຂອງເດັກໂດຍການສ້າງເກດ ແລະ ຖ້າມີອາການສົງໄສວ່າມີອາການ ASD ແມ່ນຈະນຳໃຊ້ແບບຄັດກອງໂອທິສຊິມ (ນຳໃຊ້ແບບກ້ານຕອງ M-CHAT)
- ປຶກສາຫາລືກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ເພື່ອນຳສິ່ງເດັກໄປບັງມະຕິກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ
- ສະໜອງການຝຶກອົມຮົມຂັ້ນພື້ນຖານໃນການຝຶກເດັກໂດຍນຳໃຊ້ຫຼັກສູດການສອນທີ່ ເໝາະສົມ
- ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ໃນການສອນລູກ, ການວາງແຜນຮຽນຂອງລູກຕ້ອງໄດ້ອີງໃສ່ແຕ່ລະກໍລະນີຂອງເດັກ.
- ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງກ່ຽວກັບການຝຶກແອບເດັກ
- ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ສະຖານການສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກໂອທິສຕິກໃນໂຮງຮຽນ

ສູນ ໄຊ-ເມດ

ທ່ານໝໍ ມະນີວອນ ທິແກ້ວ,

MD, MPH, Ph.D.

ບ້ານ ໂພນຕ້ອງ ສາຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ

ໂທ: 020 59536080

ວັດແອບ: 59536080

ກວດກາພະຍາດລະບົບ ປະສາດສະໝອງ, ສຸຂະພາບຈິດ, ສິ່ງເສບຕິດສຳຫຼັບ ເດັກ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່. ກວດບັງມະຕິ ແລະ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ສຳຫຼັບເດັກພັດທະນາການຊ້າ ແລະ ຜິດປົກກະຕິທາງສະໝອງ, ເດັກມີບັນຫາດ້ານການຮຽນແລະການປະພຶດແກ່ແພດໝໍ, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ.

ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ (AfA)

ສູນເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ ວຽງຈັນ (VAC)

ບ້ານໂພນປ່າເບົ້າ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ

ໂທ: 021 480 488, 020 55918117

ອີເມວ: vac@laoautism.org

- ສະໜອງການສຶກສາແບບພິເສດ
- ສົ່ງເສີມການສຶກສາແບບຮຽນຮ່ວມ
- ຝຶກວິຊາຊີບ

ໂຮງໝໍເດັກ - ຫ້ອງພັດທະນາການເດັກ

ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ເມືອງໄຊ

ໂທ: 030 5988526

- ກວດພັດທະນາການເດັກ ທົ່ວໄປ
- ປຶກສາຫາລືກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ເພື່ອນຳສິ່ງເດັກໄປບັງມະຕິກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ
- ເຄືອຂ່າຍຜູ້ປົກຄອງ

ສູນການແພດພື້ນຟູໜ້າທີ່ການ

ພະແນກຝຶກຝຸດເດັກ

ບ້ານ ສີເມືອງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ

ໂທ: 021 214044

ອີເມວ: cmrlao@cmrlao.org

ຂະແໜງພື້ນຟູຝຶກແອບທາງດ້ານລະບົບປະສາດປະກອບດ້ວຍ

- ໜ່ວຍງານເດັກພິການທາງສະໝອງ
 - ໜ່ວຍງານເດັກAutistic
 - ໜ່ວຍງານກິດຈະກຳບຳບັດ
- ຂະແໜງພື້ນຟູຝຶກແອບສະເພາະທາງປະກອບມີ
- ໜ່ວຍງານຝຶກເວົ້າ
 - ໜ່ວຍງານກວດຫຸສົມທົບໃສ່ເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງ ແລະ ຜະລິດເປົ້າຫຸທຽມ
 - ໜ່ວຍງານຈິດຕະບຳບັດ
 - ໜ່ວຍງານສັງຄົມສົງເຄາະ

ສູນການແພດອາລີອັນ

<http://www.aimclao.com/pediatrics-and-child-development-clinic>

ບ້ານວັດໄຕທົ່ງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ

ໂທ: 021 513 095

ອີເມວ: info@aimclao.com

- ກວດພັດທະນາການເດັກ ທົ່ວໄປ
- ກວດຫາອາການເດັກໂອທິສຕິກ

ຫຼວງພະບາງ

ໂຮງໝໍເພື່ອນລາວ ສຳຫຼັບເດັກນ້ອຍ

ບ້ານພູໜອກ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ

ໂທ: 071 254247

- ກວດພັດທະນາການເດັກ ທົ່ວໄປ
- ປຶກສາຫາລືກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ເພື່ອນຳສິ່ງເດັກໄປບັງມະຕິກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ
- ເຄືອຂ່າຍຜູ້ປົກຄອງ

ສະຫວັນນະເຂດ

ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ (AfA), ກຸ່ມຜູ້ປົກຄອງສະຫວັນນະເຂດ

ໂທ: 020 2273 0055

ອີເມວ: savannakhet@laoautism.org

- ປຶກສາຫາລືກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ເພື່ອນຳສິ່ງເດັກໄປບັງມະຕິກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ
- ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຕັກນິກໃນການສອນລູກ

ປາກເຊ

ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ (AfA), ສາຂາ ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ບ້ານສະໜາມໄຊ, ເມືອງປາກເຊ

ໂທ: 030 9960226

ອີເມວ: champasak@laoautism.org

00 2273 0055

- ປຶກສາຫາລືກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ເພື່ອນຳສິ່ງເດັກ ໄປບັງມະຕິກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ,
- ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແກ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຕັກນິກໃນການສອນລູກ

ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ (AfA), ສູນເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ ປາກເຊ (PAC)

ບ້ານສະໜາມໄຊ, ເມືອງປາກເຊ

ໂທ: 030 9960226

ອີເມວ: vac@laoautism.org

- ສະໜອງການສຶກສາແບບພິເສດ
- ສົ່ງເສີມການສຶກສາແບບຮຽນຮ່ວມ



ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ ແມ່ນສະມາຄົມທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນງານໂດຍຜູ້ປົກຄອງເດັກໂອທິສຕິກ. ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ ໄດ້ຮັບອານຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ຈາກກະຊວງພາຍໃນ ຕາມໃບອານຸຍາດເລກທີ 136/ພນ ລົງວັນທີ 15/3/2012.

ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກດຳເນີນງານຕາມ ວິໄສທັດ ຂອງຕົນ:

ບຸກຄົນໂອທິສຕິກສາມາດດຳລົງຊີວິດຢ່າງມີຄວາມໝາຍໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອົບອຸ່ນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເຫັນອີກເຫັນໃຈ

ສະມາຄົມເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ ເປັນຜູ້ດຳເນີນການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ສູນເພື່ອຄົນໂອທິສຕິກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ ຢູ່ ປາກເຊ.

